

Prevalin

Dinatriumcromoglicaat
20 mg/ml oogdruppels

OOG
DRUPPELS

BIJ HOOIKOORTS
EN VERGELIJKBARE
ALLERGISCHE REACTIES

PREVALIN dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml oogdruppels

ALGEMENE KENMERKEN

Benaming

Prevalin dinatriumcromoglicaat
20 mg/ml oogdruppels

Samenstelling

Prevalin dinatriumcromoglicaat
20 mg/ml oogdruppels bevat per ml
20 mg dinatriumcromoglicaat,
de werkzame stof.
Het product bevat als hulpstoffen:
benzalkoniumchloride (0,1 mg per ml),
natriumedetaat (0,1 mg/ml) en water voor
injecties.

Het product is steriel, dat wil zeggen vrij van
bacteriën, schimmels en gisten.

Verpakking

Prevalin dinatriumcromoglicaat
20 mg/ml oogdruppels wordt geleverd in een
kunststof flesje met 10 ml oplossing,
voorzien van een druppelaar en een
afsluitdopje.

Geneesmiddelengroep

Geneesmiddelen ter voorkoming van
overgevoelighedsreacties (anti-allergie
middelen).

Registratiehouder

Omega Pharma Nederland B.V.,
Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam

RVG-nummer

In het register ingeschreven onder RVG-nummer:
17237=57336 (Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml oogdruppels)

WERKING EN TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL

Werking van het geneesmiddel

Natriumcromoglicaat remt
overgevoelighedsreacties, zodat
verschijnselen als rode ogen, tranende ogen,
gezwollen oogleden, branderigheid en jeuk
van het oog worden voorkomen of
(nagenoeg) verdwijnen. De mogelijkheid
bestaat dat uw klachten niet direct
verdwijnen, doch dat dit enkele dagen duurt.

Toepassing van het geneesmiddel

Prevalin dinatriumcromoglicaat
20 mg/ml oogdruppels wordt toegepast ter
voorkoming van een ontsteking van het
bindvlies van het oog die het gevolg is van
een overgevoelighedsreactie voor een
bepaalde stof (zoals bij hooikoorts).

VOORDAT HET GENEESMIDDEL WORDT GEBRUIKT

Situaties waarbij het geneesmiddel niet mag worden gebruikt

Overgevoelighedsreactie voor één van de
bestanddelen van dit geneesmiddel.

NODIGE VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

Gebruik tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap dit geneesmiddel
uitsluitend gebruiken na overleg met uw
arts.

Gebruik tijdens het geven van borstvoeding

Tijdens de periode van borstvoeding dit
geneesmiddel uitsluitend gebruiken na
overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen

Er zijn geen gegevens bekend over het effect
van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid
en de bekwaamheid om machines te
gebruiken. Zo'n effect is echter niet
waarschijnlijk.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden

Er zijn geen wisselwerkingen van dit
geneesmiddel met andere geneesmiddelen
bekend.

Speciale waarschuwingen

Aangezien dit geneesmiddel preventief
werkt is het belangrijk de behandeling
ononderbroken voort te zetten gedurende
de periode dat u bent blootgesteld aan de
stoffen waarvoor u overgevoelig bent. Als u
dit niet doet, dan kunnen de klachten
terugkeren. Dit geneesmiddel is dus niet
geschikt om klachten direct te verhelpen,
doch met name om deze te voorkomen.

30160.6



Het dragen van zachte contactlenzen wordt afgeraden, aangezien de oogdruppels het conserveermiddel benzalkoniumchloride bevatten.

Indien u na 14 dagen onafgebroken gebruik van dit geneesmiddel geen verbetering van de klachten bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Dosering en wijze van gebruik

Indien u dit geneesmiddel op voorschrift van de arts gaat gebruiken dan dient het voorschrift van de arts te worden gevolgd.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen is vier- tot zesmaal daags één tot twee druppels in elk oog.

Raadpleeg ook de rubriek "SPECIALE WAARSCHUWINGEN".

Verschijnselen en maatregelen bij overdosering

Het is zeer onwaarschijnlijk dat zich bij overdosering problemen zullen voordoen. Indien u een vermoeden hebt dat dit wel het geval is, raadpleeg dan uw arts.

Maatregelen bij vergeten van een dosis

Indien u vergeten bent een dosis te druppelen doe dit dan alsnog zo snel mogelijk tenzij het bijna tijd is voor een volgende dosis. In het laatste geval moet de vergeten dosis niet meer worden gedruppeld, doch worden overgegaan op het gebruikelijke doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.


Verschijnselen bij plotseling stoppen met de behandeling

Bij plotseling stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel in de periode dat u bent blootgesteld aan de stoffen waarvoor u overgevoelig bent, kunnen de oorspronkelijke klachten weer terugkomen!


BIJWERKINGEN

Soms kan een kortdurende, voorbijgaande prikkeling van de ogen voorkomen na indruppelen. Wanneer deze bijwerking hinderlijk aanwezig blijft of wanneer de klachten bij regelmatig gebruik van de oogdruppels niet verminderen of zelfs


Gebruiksaanwijzing:



1. Schroef het dopje eraf zonder in de zijkant van het flesje te knijpen (de eerste keer moet u eerst de verzegeling verbreken);



4. Schroef het dopje goed erop en bewaar het flesje in de originele verpakking.



2. Plaats de wijsvinger van uw hand iets onder het midden van het onderste ooglid, trek het ooglid voorzichtig omlaag (naar de wang toe) waardoor een soort zakje ontstaat;



3. Breng het hoofd naar achteren en kijk naar uw wenkbrauw. Oefen met uw andere wijsvinger voldoende druk uit op de zijkant van het flesje om één druppel van het product in het oog te brengen, breng de druppel in de onderste buitenhoek van het oog en neem de wijsvinger van het flesje weg (probeer met de druppelaar van het flesje uw oog niet aan te raken). Knipper enkele malen met de ogen. Herhaal de stappen 2 en 3 voor het andere oog;

verergeren, raadpleeg dan uw arts.

Bij langdurig én regelmatig dagelijks gebruik van de oogdruppels kan schade aan het oog optreden als gevolg van de inwerking van benzalkoniumchloride. Gebruik daarom de oogdruppels uitsluitend in de periode waarin u bent blootgesteld aan de stoffen waarvoor u overgevoelig bent volgens het geadviseerde doseringsschema of volgens het voorschrift van uw arts.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml oogdruppels bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25°C) in de originele verpakking.

Het geneesmiddel mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. De oogdruppels zijn, mits onaangebroken, houdbaar tot de op de verpakking vermelde uiterste gebruiksdatum achter "Niet te gebruiken na". Wanneer het flesje eenmaal is geopend dan mag de inhoud ervan niet langer dan 1 maand worden gebruikt mits bewaard volgens het voorschrift. Bewaar dit geneesmiddel buiten bereik van kinderen!

Datum van meest recente herziening: juli 2012

